



PRODUKTINFORMATION

Ultrana CimoCid Alkoholische Lösung zur Händedesinfektion

Rel. 02/2021

CimoCid eignet sich zur schnellen Händedesinfektion in Einrichtungen, Lebensmittelbereichen, Industrie und privaten Haushalten. Die hygienische Händedesinfektion auf Alkoholbasis wirkt sofort und ist sehr gut hautverträglich. Rückfettende Hautpflegekomponenten tragen trotz häufiger Anwendung Sorge für eine gesunde Haut. **CimoCid** vernichtet zuverlässig 99,9% der Krankheitserreger auf der Haut. Verwenden Sie **CimoCid** um sich und die Menschen in Ihrer Umgebung zu schützen. Die handliche Sprühflasche ist ideal für Kasacks, Handtaschen und auf Reisen.

- ✓ Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren) gem. RKI-Empfehlung 01-2004
- ✓ Bakterizid (inkl. MRSA (Mycobacterium tuberculosis), fungizid und tuberkulozid
- ✓ Wirksam gegen Rota- und Noroviren (MNV)
- ✓ Dermatologisch mit ‚sehr gut‘ bewertet
- ✓ Frei von Farb-, Duft- und weiteren Zusatzstoffen
- ✓ Besonders hautverträglich
- ✓ Mit allen Waschlotionen kompatibel
- ✓ VAH- und IHO gelistet
- ✓ HACCP konform

Inhaltstoffe:

100 g Lösung enthalten: 63,1 g Propan-2-ol und 2,9 g Ethanol.

BAuA: Reg.-Nr. N-58085

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Verkaufseinheiten:

Karton mit 16 Flaschen á 500 ml

Karton mit 20 Sprühflaschen á 50 ml

Thekendisplay mit 15 x 50 ml

Karton mit 12 EURONORM-Flaschen á 1.000 ml

PZN 50 ml: 1246 9110, PZN 500ml: 17214320

Anwendung:

CimoCid in die gereinigten und trockenen Hände einreiben und während der Einwirkzeit feucht halten.

Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate.

Nebenwirkungen: Insbesondere bei sehr häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Austrocknung) kommen. In diesem Fall sind die Hautschutzmaßnahmen zu verstärken. Auch Kontaktallergien sind möglich. Bei Auftreten von nicht aufgeführten Nebenwirkungen informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Gegenanzeigen: Nicht bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe anwenden. Nicht auf Schleimhäuten anwenden.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Anwendungsgebiet / Wirksamkeit	Konzentration / Einwirkzeit
Hygienische Händedesinfektion, bakterizid und levurozid gemäß VAH, EN 1500	konz. 30 Sek. *
tuberkulozid (M. terrae) gemäß EN 14348 hohe und niedrige Belastung	konz. 30 Sek. *
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV und Coronaviren) gemäß EN 14476 niedrige Belastung	konz. 15 Sek. **
Rotaviren gemäß EN 14476 ohne Belastung	konz. 30 Sek. *
Noroviren gemäß EN 14476 niedrige Belastung	konz. 30 Sek. *

* Die Hände während der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Präparat feucht halten.
** Für die hygienische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten.



Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.